solovivo®

MANEJO INTEGRADO DE SOLO



renovagro®

INOVAÇÃO A FAVOR DO SOLO


Conheça nossa linha completa de
BLENDS DE PLANTA DE COBERTURA para diversas culturas e finalidades, como ciclagem de nutrientes e retenção de umidade, geração de matéria orgânica, descompactação do terreno, além de combater plantas daninhas e supressão de nematoides.
renovagro®


Café ULTRA




Espécies

Crambe, Milheto, Nabo Forrageiro, Capim Coracana, C. Ochroleuca, Trigo Mourisco

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

Região 7
Região 6
Região 5
Região 4
Região 3
Região 2
Região 1



Manejo

Época de Plantio



Recomendado
Restrição

Plantio

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
25	22,5	90

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MS, MG, GO, ES, BA	Regiões 4 e 5

renovagro

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


Café WINTER




Espécies

Tremoço Branco, Nabo Forrageiro, Aveia Preta, Trigo Mourisco, Triticale, Ervilha Forrageira

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo


• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Manejo

Época de Plantio



Plantio

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
45	40,5	90

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MS, MG, GO, ES	Regiões 2, 3 e 4

renovagro

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


Café+MASSA




Espécies

Crambe, Nabo Forrageiro, Capim Coracana, Brachiaria Ruziziensis, C.ochroleuca, Trigo Mourisco

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo


• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Manejo

Época de Plantio



Plantio

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.


	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
25	22,5	90

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA, MA, PI, RO	Regiões 4, 5, 6 e 7

renovagro®

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


CaféREDUCT




Espécies

Trigo Mourisco, C. Oochroleuca, C. Breviflora, Capim Coracana, Crambe e Brachiaria Ruziziensis

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Manejo

Época de Plantio



Plantio

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
25	22,5	90

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA, MA, PI, RO	Regiões 4, 5, 6 e 7

renovagro

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


CanaULTRA




Espécies

C. Ochroleuca, C. Breviflora
Trigo Mourisco, Guandu,
Crambe, Nabo Forrageiro

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

Região 7
Região 6
Região 5
Região 4
Região 3
Região 2
Região 1



Manejo

Época de Plantio



Plantio

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
25	22,5	90

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA	Regiões 4, 5 e 6

renovagro

soloVIVO®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


Consórcio CANA




Espécies

Crambe, C. Breviflora, C. Ochroleuca, Trigo Mourisco, C. Spectabilis

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

Região 7
Região 6
Região 5
Região 4
Região 3
Região 2
Região 1



Manejo

Época de Plantio



Recomendado
Restrição

Plantio

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
25	22,5	60

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA	Regiões 4, 5 e 6

renovagro

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


MilhoNUTRIC




Espécies

Crambe, Capim Coracana, Nabo Forrageiro e Trigo Mourisco

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Manejo

Época de Plantio



Plantio

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
15	13,5	Pós Milho

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA, MA, PI, RO	Regiões 4, 5, 6 e 7

renovagro

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


Milho +Gramínea




Espécies

Capim Coracana, Aveia Preta
Centeio, Brachiaria Ruziziensis

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Manejo

Época de Plantio



Plantio

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
35	31,5	90

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA, MA, PI, RO	Regiões 4, 5, 6 e 7 (Cultivo protegido o ano todo)

renovagro

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


MilhoSALUD




Espécies

Brachiaria Ruziziensis,
Capim Coracana,
C. Breviflora, Trigo Mourisco

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Manejo

Época de Plantio



Plantio

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
15	13,5	Pós Milho

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA, MA, PI, RO	Regiões 4, 5, 6 e 7

renovagro

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


Pastagem




Espécies

Brachiaria Ruziziensis, Capim Coracana, Milheto, Sorgo Forrageiro, Feijão Mungo e Guandu Anão

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

Região 7
Região 6
Região 5
Região 4
Região 3
Região 2
Região 1



Manejo

Época de Plantio



Plantio

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
25	22,5	120 ou Pós Pastejo

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA, MA, PI, RO	Regiões 4, 5, 6 e 7

renovagro®

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


Reduct




Espécies

Crambe, Milheto, C. Breviflora, Trigo Mourisco e C. Ochroleuca

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Manejo

Época de Plantio



- Recomendado
- Restrição

Plantio

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
25	22,5	90

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA, MA, PI, RO	Regiões 4, 5, 6 e 7

renovagro

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


Reduct +MASSA




Espécies

Trigo Mourisco, C. Ochroleuca, Milheto, C. Breviflora, Brachiaria Ruziziensis, Capim Coracana e Crambe

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

Época de Plantio



Plantio

- Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;
- Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);
- Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;
- Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

Plantio (kg/ha)		Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
30	27	90

Manejo

- Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;
- Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;
- Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA, MA, PI, RO	Regiões 4, 5, 6 e 7

renovagro

SOLO VIVO®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


PréMILHO




Espécies

Nabo Forrageiro, Aveia Preta e Centeio

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

- Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;
- Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;
- Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Manejo

Época de Plantio



Plantio

- Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;
- Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);
- Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;
- Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
50	45	90

Indicação por UF	Regiões Indicadas
RS, SC, PR, SP, MG, GO	Regiões 1, 2, 3 e 4

renovagro

soloVIVO®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


PréSOJA




Espécies

Aveia Preta, Centeio, Ervilhaca Comum e Nabo Forrageiro

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

Época de Plantio



Plantio

- Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;
- Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);
- Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;
- Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

Plantio (kg/ha)		Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
50	45	90

Manejo

- Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;
- Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;
- Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Indicação por UF	Regiões Indicadas
RS, SC, PR, SP, MG, GO	Regiões 1, 2, 3 e 4

renovagro

SOLO VIVO®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


PréTRIGO




Espécies

Trigo Mourisco, Nabo Forrageiro e Aveia Preta

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Manejo

Época de Plantio



Plantio

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.


	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
40	36	70

Indicação por UF	Regiões Indicadas
RS, SC, PR, SP, MG, GO	Regiões 1, 2, 3 e 4

renovagro

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


Revitaliza




Espécies

Brachiaria Ruziziensis, Nabo Forrageiro, Milheto, C. Ochroleuca, Crambe, Capim Coracana e Feijão Mungo

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

Região 7
Região 6
Região 5
Região 4
Região 3
Região 2
Região 1



Manejo

Época de Plantio



Plantio

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
25	22,5	90

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA	Regiões 4, 5 e 6

renovagro

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


SoloSPEED




Espécies

Crambe, Nabo Forrageiro, Sorgo Forrageiro, Trigo Mourisco, Milheto e Feijão Mungo

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

Época de Plantio



Plantio

- Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;
- Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);
- Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;
- Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
35	31,5	45 - 60

Manejo

- Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;
- Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;
- Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Indicação por UF	Regiões Indicadas
RS, SC, PR, SP, MG ,GO	Regiões 1, 2, 3 e 4 (Cultivo protegido o ano todo)

renovagro

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


UltraMIX




Espécies

Crambe, Nabo Forrageiro, Milheto Trigo Mourisco, C. Ohroleuca e Capim Coracana

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Manejo

Época de Plantio



Plantio

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
25	22,5	70 - 80

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA, MA, PI, RO	Regiões 4, 5, 6 e 7

renovagro®

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


WinterULTRA



Espécies

Aveia Branca, Aveia Preta, Centeio, Ervilha Forrageira

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

Época de Plantio



- Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;
- Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);
- Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;
- Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
50	45	90

Manejo

- Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;
- Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;
- Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

Região 7
Região 6
Região 5
Região 4
Região 3
Região 2
Região 1



Indicação por UF	Regiões Indicadas
RS, SC, PR, SP, MG, GO	Regiões 1, 2, 3 e 4

renovagro

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


Fast




Espécies

Crambe, Trigo Mourisco, Nabo forrageiro e Milheto

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Manejo

Época de Plantio



• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.


	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
25	22,5	45-60

Indicação por UF	Regiões Indicadas
RS, SC, PR, SP, MG, GO	Região 3, 4, 5, 6, 7 (cultivo protegido ano todo)

renovagro®

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


PowerMIX




Espécies

Trigo Mourisco, Milheto, Crambe, Capim Coracana e Nabo forrageiro.

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

Região 7
Região 6
Região 5
Região 4
Região 3
Região 2
Região 1



Manejo

Época de Plantio



Recomendado
Restrição

• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
25	22,5	90

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA, MA, PI, RO	Regiões 4, 5, 6 e 7

renovagro®

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


Combat




Espécies

Capim coracana,Crambe, C. ochroleuca, Milheto e Trigo mourisco.

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Manejo

Época de Plantio



• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.


	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
30	27	90

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA, MA, PI, RO	Regiões 4, 5, 6 e 7

renovagro

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO


Recover




Espécies

Nabo forrageiro, Crambe, Capim coracana, Feijão Mungo, Milheto e C.ochroleuca

Proporção Famílias (plantas/m²)



Ciclagem Nutrientes (kg/ha)



Função do Blend



Manejo

• Fazer manejo na época recomendada com Rolo Faca de preferência, ou grade niveladora caso não tenha o Rolo Faca;

• Observar 30 dias após se houve Rebrote, nesse caso utilizar a dessecação para finalizar o manejo;

• Rolar a cobertura sempre no sentido do plantio, facilitando o corte da matéria orgânica na época de plantio.

Regiões

- Região 7
- Região 6
- Região 5
- Região 4
- Região 3
- Região 2
- Região 1



Manejo

Época de Plantio



• Fazer dessecação antes do plantio em caso de excesso de ervas daninhas com o produto recomendado, respeitando a carência para a implantação do MIX;

• Plantio a Lanço - Trabalhar com faixa de aplicação com no máximo 8 metros, com gradagem leve para cobrir as sementes (2 a 3 cm de profundidade);

• Plantio com Semeadeira (17 cm) ou Plantadeira com caixa para sementes miúdas - reduzir a quantidade de sementes por hectare de 10%, profundidade de plantio 2 a 3 cm;

• Observação com semeadeiras de rotores devido a alguns blends possuírem sementes acima de 7 mm, pode ocasionar travamento ou quebra das sementes.

Recomendação de plantio SOLO VIVO - A LANÇO, devido à indicação ser por m², maior diversificação e raízes em 100% da área.

No caso dos Blends Milho Nutric ou Milho Salud, fazer o plantio junto com a cultura do milho.

	Plantio (kg/ha)	Manejo da cobertura
Lanço (kg/ha)	Semeadeira (kg/ha)	Dias Após Plantio
25	22,5	80

Indicação por UF	Regiões Indicadas
PR, SP, MG, GO, MS, TO, MT, BA	Regiões 4, 5 e 6

renovagro®

solovivo®
MANEJO INTEGRADO DE SOLO

Reestruturação da **vida e da saúde do solo.**

Trabalhando **lado a lado com o produtor.**

Transformando lavouras em sistemas produtivos, **sustentáveis e de alta performance.**





www.**renovagro**.com.br

renovagrooficial